



Близько 70 000 людей в Англії не знають, що вони хворі на гепатит С

Гепатит С передається через контакт з кров'ю, часто без симптомів. Тривала інфекція гепатиту С може спричинити довготривале ураження печінки.

Перевірте свій стан вже сьогодні за допомогою безкоштовного домашнього тесту.

Чи відносяться ці фактори ризику до вас?



Люди, які народилися або вирости в країнах з високою поширеністю (Єгипет, Пакистан, Португалія, включаючи Мадейра, Україна, Польща та колишні радянські республіки, включаючи Молдову, Латвію та Румунія).



Ви проколювали собі пірсинг, робили татуювання, електроліз, наносили перманентний макіяж, ботокс або голковколювання в країні чи приміщенні, де процедури інфекційного контролю можуть бути незадовільними, або використовували обладнання, яке, можливо, не було простерилізоване.



Проходили стоматологічну операцію або стоматологічні процедури в країні або в приміщенні, де процедури інфекційного контролю можуть бути незадовільними. Користувалися спільною зубною щіткою з людиною, яка може мати гепатит С.



Отримувачі переливання крові до 1996 року та/або ті, хто отримував лікування препаратами крові NHS до 1986 року в Англії

Просто відскануйте QR-код або відвідайте <https://heptest.nhs.uk/>, щоб замовити тест



[/heptest.nhs.uk/ref/ntm1](https://heptest.nhs.uk/ref/ntm1)



Спільне обладнання, яке використовується для одноразового вживання рекреаційних препаратів або препаратів, що підвищують працездатність, таких як стероїди.