



Около 70 000 человек в Англии не знают, что у них гепатит С

Гепатит С передается при контакте крови с кровью, часто без каких-либо симптомов.

Длительная инфекция гепатита С может привести к поражению печени в долгосрочной перспективе.

Проверьте свой статус уже сегодня с помощью бесплатного домашнего теста.

Применимы ли к вам эти факторы риска?



Лица, родившиеся или выросшие в странах с высокой распространенностью заболевания (Египет, Пакистан, Португалия, включая Мадейру, Украина, Польша, Россия и страны бывшего СССР, включая Молдову, Латвию и Румынию).



Делали пирсинг, татуировки, электролиз, полуперманентный макияж, ботокс или акупунктуру в стране или помещении, где могут быть нарушены процедуры инфекционного контроля или использовалось оборудование, которое могло быть не простерилизовано.



Перенесли стоматологическую операцию или стоматологические процедуры в стране или в помещениях, где может быть плохой инфекционный контроль. Пользовались общей зубной щеткой с человеком, который может быть болен гепатитом С.




Получали переливание крови до 1996 г. и (или) получившие лечение препаратами крови по программе NHS до 1986 г. в Англии.

Чтобы заказать тест, просто отсканируйте QR-код или посетите сайт <https://hepctest.nhs.uk/>



[/hepctest.nhs.uk/ref/ntm1](https://hepctest.nhs.uk/ref/ntm1)



Совместно использовали оборудование для приема рекреационных или стимулирующих препаратов, таких как стероиды, даже однократно.