



Apie 70 000 žmonių Anglijoje nežino, kad serga hepatitu C

Hepatitis C plinta per kraujo sąlytį, neretai nesukeliant jokių simptomų. Užsitęsusi hepatito C infekcija gali sukelti ilgalaikius kepenų pažeidimus.

Dar šiandien patikrinkite savo sveikatos būklę atlikdami nemokamą testą namuose.

Ar šie rizikos veiksniai taikomi jums?



Žmonės, gimę arba augę didelio sergamumo šalyse (Egipte, Pakistane, Portugalijoje, įskaitant Madeirą, Ukrainoje, Lenkijoje, Rusijoje ir buvusiose sovietinėse respublikose, įskaitant Moldovą, Latviją ir Rumuniją).



Buvo veriamas auskaras, daryta tatuiruotė, elektrolizė, atliktas pusiau ilgalaikis makiažas, botoksas ar akupunktūra šalyje ar patalpose, kuriose infekcijų kontrolės procedūros galėjo būti prastos arba naudota įranga, kuri galėjo būti nesterilizuota.



Buvo atlikta odontologinė operacija ar odontologinės procedūros šalyje ar patalpose, kuriose infekcijų kontrolės procedūros gali būti prastos. Dalintasi dantų šepetėliu su asmeniu, kuris galėjo sirgti hepatitu C.



Gavusieji kraujo perpylimus iki 1996 mėn. ir/arba tie, kurie iki 1986 m. Anglijoje buvo gydyti NHS kraujo preparatais.

Norėdami užsisakyti testą, tiesiog nuskaitykite QR kodą arba apsilankykite svetainėje



[/hepctest.nhs.uk/ref/ntm1](https://hepctest.nhs.uk/ref/ntm1)



Net ir vieną kartą naudota bendra įranga, skirta mėgėjiškai ar sportinę veiklą gerinantiems preparatams, pvz., steroidams, vartoti.