



# Aproximativ 70.000 de persoane din Anglia nu știu că suferă de hepatita C

Hepatita C se transmite prin contact sangvin direct cu sânge infectat, adesea fără simptome.

Infecția prelungită cu hepatita C poate provoca leziuni hepatice pe termen lung.

Verificați-vă starea de sănătate astăzi cu ajutorul unui test gratuit de utilizat la domiciliu.

## Vi se aplică acești factori de risc?



Persoane născute sau crescute în țări cu prevalență ridicată (Egipt, Pakistan, Portugalia, inclusiv Madeira, Ucraina, Polonia, Rusia și statele din fosta republică sovietică, inclusiv Moldova, Letonia și România).



S-a supus unor proceduri de piercing, tatuare, electroliză, machiaj semipermanent, botox sau acupunctură într-o țară sau într-o locație în care procedurile de control al infecțiilor ar putea fi deficitare sau s-a utilizat un echipament posibil nesterilizat înainte.



A beneficiat de intervenții chirurgicale stomatologice sau de proceduri stomatologice într-o țară sau într-o locație în care procedurile de control al infecțiilor pot fi deficitare. A folosit aceeași periuță de dinți cu o persoană care ar putea avea hepatită C.



A beneficiat de transfuzii de sânge înainte de 1996 și/sau persoanele care au primit tratament cu un produs sanguin NHS înainte de 1986 în Anglia.

Scanați direct codul QR sau  
vizitați

<https://heptest.nhs.uk/>  
pentru a comanda un test



[/heptest.nhs.uk/ref/ntm1](https://heptest.nhs.uk/ref/ntm1)



A partajat echipamentul folosit pentru a lua droguri recreaționale sau medicamente de îmbunătățire a performanței, de exemplu, steroizi, chiar și o singură dată.