



Okolo 70 000 osób w Anglii nie wie, że choruje na zapalenie wątroby typu C

Zapalenie wątroby typu C roznosi się przez kontakt krwi, często **bezobjawowo**.
Chroniczne zapalenie wątroby typu C może spowodować długoterminowe zniszczenie wątroby.

Sprawdź swój stan już dziś darmowym testem domowym.

Czy te czynniki ryzyka dotyczą Ciebie?



Osoby urodzone lub wychowane w krajach z wysokim występowaniem (Egipt, Pakistan, Portugalia w tym Madeira, Ukraina, Polska, Rosja i kraje byłego Związku Radzieckiego w tym Mołdawia, Litwa i Rumunia).



Przekłucie ciała, tatuaże, elektroliza, pół-permanentny makijaż, botoks lub akupunktura w kraju lub na terenie nieruchomości, gdzie procedury kontroli infekcji mogą być niepoprawne lub przy użyciu sprzętu, który mógł być niewysterylizowany.



Przeprowadzona operacja lub zabieg dentystyczny w kraju lub na terenie nieruchomości, gdzie procedury kontrolowania infekcji mogą być niepoprawne. Dzielona szczoteczka do zębów z osobą chorą na zapalenie wątroby typu C.



Biorcy transfuzji krwi przed 1996 i/lub osoby, które leczone były produktami krwi Narodowego Funduszu Zdrowia (NHS) przed 1986 w Anglii.

Po prostu zeskanuj kod QR
lub wejdź na stronę
<https://hepctest.nhs.uk/>,
aby zamówić test



[/hepctest.nhs.uk/ref/ntm1](https://hepctest.nhs.uk/ref/ntm1)



Wspólny sprzęt używany do
zażywania rekreacyjnych lub
poprawiających wydajność
leków takich jak sterydy, nawet
jedenrazowo.